

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm01143&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 01143. Перелом статевого члена

Автор: Timo Laurila
Редактор оригінального тексту: Jukkapekka Jousimaa
Дата останнього оновлення: 2017-09-04

Основні положення

- Під переломом пеніса розуміється розрив білкової оболонки, яка огортає кавернозне тіло, під час ерекції.
- Найбільш поширеними причинами такого ушкодження є скручування пеніса під час статевого акту та інші травми.
- Позиція жінки “зверху” під час сексуального акту являє найбільший ризик.
- Першими симптомами є втрата ерекції, біль, посиніння та набряк пенісу.
- Через делікатність пошкодження пацієнтам незручно перед лікарем, часто звертаються за лікуванням з затримкою.
- Розриви мають піддаватися хірургічній корекції настільки швидко, наскільки це можливо.
- Більш поширеними є невеликі травми пеніса, можливо з локальною болючістю, посинінням, але без деформації пеніса і зі збереженою здатністю до ерекції.

Механізм травми

- Білкова оболонка утворює міцні, еластичні футляри зі сполучної тканини, що огортають кожен з двох циліндрів еректильної тканини (кавернозних тіл).
- Скручування ерегovanого статевого члена може призвести до розриву білкової оболонки.
- Розрив зазвичай унілатеральний та поперечний, розташований біля основи пеніса.
- Розрив білкової оболонки в деяких випадках може бути асоційований з пошкодженням уретри і навколишнього губчастого тіла.
- Найбільш поширеною причиною такого пошкодження є згинання пеніса під час статевих зносин, тобто "перешкода проникненню".
- Рідкісні причини включають жорстку маструбацію, поворот у ліжку і навмисне скручування пенісу для досягнення зменшення розмірів.
 - Слід зазначити, що в деяких країнах Близького Сходу згадується практика ("taghaandan"), яка спричиняє більшу половину всіх переломів статевого члена.
- Переломи пеніса за відсутності ерекції дуже рідкісні (3% випадків).

Симптоми та ознаки

- Розрив білкової оболонки зазвичай супроводжується характерним чутним хрупаючим звуком.
- Це супроводжується негайним зменшенням розміру, сильним болем, значним набряком та посинінням пеніса.
- Далі від місця розриву часто можна побачити відхилення статевого члена.
- Не зважаючи на те, що власне сам розрив майже неможливо локалізувати пальпаторно, гематому, що формується над ним, можна пропальпувати.
- Гематурія і труднощі при сечовипусканні можуть вказувати на пошкодження уретри. У таких випадках встановлення надлобкового катетера (Cystofix[®]) слід розглядати як першу допомогу.

Наступні обстеження

- Типового анамнезу та клінічних даних достатньо для встановлення діагнозу.
- Ультразвукове (Доплерівське) дослідження статевого члена може бути розглянуте для встановлення більш точної локалізації розриву перед хірургічним втручанням.
- Дослідження з використанням контрастування або МРТ можуть бути розглянуті в деяких випадках.
- Подальші обстеження не повинні затримувати хірургічне втручання, якщо є висока ймовірність перелому статевого члена.

Лікування

- Достатньо рання хірургічна корекція розриву дає найкращі результати.
- Під час хірургічного втручання розрив локалізують та ушивають швами, що розсмоктуються.
- Часто виконується циркумцизія (обрізання).
- Після одужання після успішного хірургічного лікування, більшість пацієнтів здатні до нормальних статевих актів.

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm01143 Ключ сортування: 011.024 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2017-09-04

Автор(и): Timo Laurila Редактор(и): Jukka Pekka Jousimaa Лінгвіст(и)-консультант(и) англomовної версії: Hilka Salmén
Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Urology Traumatology

Ключові слова індексу
speciality: Traumatology speciality: Urology Erection Erectile dysfunction Erectile disorder Fracture Masturbation
Erectile tissue Cavertous tissue Penis Penis fracture Penile fracture Penile tear Intercourse Pain
icd-10: S30.2