

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00159&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00159. Вивих скронево-нижньощелепного суглоба

Автор: Editors

Редактори оригінального тексту: -

Дата останнього оновлення: 2015-11-04

Основні положення

- Вивих майже завжди виникає спонтанно, у деяких людей виникає внаслідок травми, під час позіхання або огляду в стоматолога.
 - Зазвичай, вивих однобічний, але може бути й двобічним.
 - Гострий вивих легко вправляється.
- Зазвичай, репозицію легко виконати за інтактною нижньою щелепи.
- Якщо нижня щелепа зміщена дозад, це означає, що у пацієнта перелом суглобового відростку. У таких випадках одразу необхідна консультація щелепно-лицевого хірурга.

Симптоми

- Пацієнт не може закрити рот.
- Суглобовий відросток, зазвичай, зміщений вперед від суглобового горбка скроневої кістки. У випадках, коли суглобовий відросток повністю вийшов з суглобової ямки, пальпується заглиблення у привушній ділянці.
- За одностороннього вивиху щелепа зміщується у здоровий бік.

Лікування

1. Пацієнта необхідно посадити. Асистент стоїть за пацієнтом підтримуючи його голову. Асистент може спробувати розслабити жувальні м'язи пацієнта шляхом акуратного масажу його щік.
 2. Покладіть великі пальці як можна глибше за останні моляри в порожнині рота пацієнта. Іншими пальцями притримуйте нижню щелепу зовні. Потягніть щелепу донизу, поки м'язи не змістять суглоб назад у його правильне положення.
- Якщо репозиція пройшла невдало, скеруйте пацієнта до щелепно-лицевого хірурга, бажано в той же день.
 - Якщо вивих часто рецидивує, необхідна консультація щелепно-лицевого хірурга.

Пов'язані джерела

- Інші інтернет-ресурси [пов'язані] [00722] [Dislocation of the tempo...]

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm00159 Ключ сортування: 018.006 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2015-11-04

Автор(и): Editors Редактор(и): Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Surgery Traumatology Dental medicine Maxillofacial surgery

Ключові слова індексу
ісрс-2: L80 ісрс-2: L07 mesh: Mandible mesh: temporomandibular dislocation mesh: Chin mesh: Jaw
mesh: reposition Dislocation speciality: Maxillofacial surgery speciality: Surgery speciality: Traumatology
speciality: Dental medicine