

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00234&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00234. Слабкий струмінь сечі

Автор: Teuvo Tammela
Редактор оригінального тексту: Jukka Pekka Jousimaa
Дата останнього оновлення: 2015-03-18

Етіологія

- У чоловіків старших за 60 років простата зазвичай має збільшений об'єм (доброякісна гіперплазія простати [настанова 00246] Benign prostatic hyperplasia) або карцинома простати з обструктивним компонентом [настанова 00247] Рак передміхурової залози).
- Анатомічна або функціональна обструкція уретри та шийки сечового міхура, як наслідок, наприклад, травми або операції.
- Детрузорно-сфінктерна дисинергія при нейрогенному сечовому міхурі асоційована з, наприклад, травмою або захворюванням спинного мозку.
- Знижена скоротливість розтягнутого м'яза-детрузора.
- У жінок пролапс матки або слизової оболонки уретри.

Обстеження

- Пальцеве ректальне дослідження (ПРД) простати
- Пальпація та перкусія сечового міхура для виявлення затримки сечі [настанова 00235] Затримка сечі
- Оцінка об'єму залишкової сечі: ультразвукове дослідження [настанова 00905] Визначення об'єму залишк... (або катетеризація) після сечовиділення

- Інтерпретація показників об'єму залишкової сечі:
 - < 100 мл — норма
 - > 200 мл — потребує подальшого обстеження
 - > 400 мл — потребує дренування сечового міхура (цистостомія, постійна катетеризація або періодична самокатетеризація).
- Наявність перешкоди до катетеризації може свідчити про наявність стриктури уретри.
- Оцінка рівня простат-специфічного антигена (ПСА) у чоловіків [\[настанова 00246 | Benign prostatic hyperpl...\]](#)
- Анкета вираженості симптомів (IPSS [\[програма 00011 | International prostate s...\]](#) або DAN-PSS)
- Показання до госпіталізації: див. настанови “Гіперплазія простати” [\[настанова 00246 | Benign prostatic hyperpl...\]](#)
- У лікарні вимірювання швидкості потоку сечі є первинним дослідженням.

Пов'язані ресурси

- Література [\[пов'язані 00112 | Poor urine flow – Relate...\]](#)

Настанови

- [Настанова 00246](#). Benign prostatic hyperplasia.
- [Настанова 00247](#). Рак передміхурової залози.
- [Настанова 00235](#). Затримка сечі.
- [Настанова 00905](#). Визначення об'єму залишкової сечі з допомогою ультразвукового дослідження.

Калькулятори й анкети

- [Програма 00011](#). International prostate symptom score (IPSS).

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2015-03-18

Автор(и): Teuvo Tammela Редактор(и): Jukka Pekka Jousimaa Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії

EBM Guidelines Surgery Urology

Ключові слова індексу

mesh: residual urine mesh: Urination Disorders mesh: Urinary Catheterization mesh: weak urinary stream urine
urine flow urination speciality: Surgery icpc-2: U05 speciality: Urology