

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00251&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00251. Хвороба Пейроні (фібропластична індурація статевого члена)

Автор: Mika Raitanen
Редактор оригінального тексту: Jukka Pekka Jousimaa
Дата останнього оновлення: 2016-12-01

Симптоми і прояви хвороби

- Фібропластична індурація печеристих тіл
- Етіологія невідома; проте, у деяких пацієнтів (9–39%) діагностують контрактуру Дюпюїтрена на долонях.
- Шкіра на місці індурації здорова та вільно рухається.
- Статевий член під час ерекції викривляється в бік індурації. Одна третина пацієнтів також скаржиться на біль під час ерекції.
- Диференційна діагностика проводиться з поширеною в статевий член карциномою простати (виконайте пальпацію простати).
- Фотознімки, зроблені пацієнтом власноруч, демонструють викривлення статевого члена під час ерекції та стають у нагоді при оцінці симптомів.

Лікування

- У кожного другого пацієнта відбувається самостійне одужання без будь якого лікування.
- Фаза болю може тривати декілька місяців.

- Більшість пацієнтів здатні виконати статевий акт, отже не мають показань до лікування.
- Якщо статевий член помітно викривлений, рекомендована консультація уролога.
- Ін'єкційні протеїнази (колагенази *clostridium histolyticum*) доступні для фармакотерапії. Ін'єкція препарату виконується у місце індурації.
 - Один лікувальний курс включає у себе максимум 4 цикли. Кожен цикл складається з 2 ін'єкцій та однієї процедури модуляції статевого члена.
 - Ін'єкції має виконувати фахівець, який має відповідні навички введення цих препаратів та добре знайомий з діагностикою та лікуванням урологічних захворювань у чоловіків.
 - На даний час досвід використання цього методу обмежений.
- Можлива хірургічна корекція не виконується до закінчення больової фази та перебіг хвороби залишається стабільним щонайменше 3 місяці.

Пов'язані ресурси

- Інтернет-ресурси [пов'язані 01031] [Peyronie's disease \(Indu...\]](#)

Джерела інформації

R3. Honig SC. Intralesional collagenase in the treatment of Peyronie's disease. *Ther Adv Urol* 2014;6(2):47-53. [PubMedID|24688600] [веб|https://www.ncbi.nlm.nih...]

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm00251 Ключ сортування: 011.021 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2016-12-01

Автор(и): Mika Raitanen Редактор(и): Jukka Pekka Jousimaa Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Surgery Urology

Ключові слова індексу

mesh: Penile Induration mesh: Penis Peyronie's disease Peyronie disease Induratio penis plastica
plastic induration of the penis penile fibromatosis curved penis mesh: Penile Erection mesh: Contracture
mesh: cavernous body of the penis speciality: Surgery speciality: Urology icpc-2: Y99