

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:  
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00582&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.  
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

# Настанова 00582. Розвиток мови та промовляння

Автор: Mari Qvarnström  
Редактор оригінального тексту: Jukka Pekka Jousimaa  
Дата останнього оновлення: 2018-08-09

## Основні положення

- Діти, які відстають від ровесників у розвитку, повинні направлятися на консультацію до логопеда <sup>[доказ 02746]</sup> [C].
- Важливо спостерігати за спілкуванням: як дорослий спілкується з дитиною; яка стадія емоційного розвитку дитини; який психологічний стан?
- Затримка розвитку мови може бути першою ознакою певних мовних проблем, дислексії <sup>[настанова 00692]</sup> [Розлади здатності до нав...], порушення слуху, розумової відсталості, аутизму або інших станів, пов'язаних з проблемами у спілкуванні <sup>[настанова 00694]</sup> [Розлади аутистичного спе...], моторних розладів (диспраксія) <sup>[настанова 01051]</sup> [Синдром дитячої незграбн...], депривації, проблем у сім'ї <sup>[настанова 01023]</sup> [Спостереження за психоло...] та складних психосоціальних проблем дитини з різноманітним підґрунтям.
- Наявність хорошого слуху — це основа нормального розвитку мови. Тому потрібно перевіряти слух дитини.
- Сімейний анамнез мовних проблем та порушення уваги значить більше, ніж контроль за розвитком мовних навичок і комунікації дитини.

## Проблеми, що потребують консультації логопеда в різному віці

- Перший рік життя
  - мало звуків та гуління
  - поганий контакт з дорослими
  - підозра на порушення слуху
  - поганий ковтальний і смоктальний рефлекс; утруднення під час годування
  - коротка вуздечка язика [Настанова 00590] | Структурні аномалії у ді...]
- Діти у віці 1–2 роки
  - Не вимовляє слів, не робить спроб їх вимовити або якимось іншим чином виразити свою думку (жестами)
  - Підозра на те, що дитина погано розуміє звернену мову або не виконує інструкції (потрібно завжди пам'ятати щодо середніх отитів, що повторюються, як про причину порушення слуху)
  - Дитина не обережна
  - Важко налагодити контакт з дитиною
  - Мова скандована або не зрозуміла після другого року життя.
  - Якщо дитина, що виросла в двомовній сім'ї, має малий словниковий запас, але в іншому розвивається нормально, розуміє звернену мову та прохання, їй необхідні заняття з логопедом.
- Діти у віці 3–4 років
  - Мова неправильна або незрозуміла (міняє місцями склади або звуки, скорочує довгі слова)
  - Значні граматичні помилки
  - Малий словниковий запас, труднощі в підборі слів
  - Мало говорить, всього декілька речень
  - Неадекватні відповіді, "власна мова"
  - Заїкання продовжується або починається після віку, коли воно ще є фізіологічним (близько 3 років)
  - Утруднене спілкування, дитина не зупиняється, щоб послухати

- Труднощі при виконанні простих інструкцій.
- Діти у віці 5–6 років
  - Помилки вимови (р, с, л, к та ін.) — потрібно виправити до шкільного віку
  - Мова не плавна (затинання та незграбність мови)
  - Обмежена та погано розвинена мова для даного віку
  - В цілому мова не зрозуміла, що може бути пов'язано з моторними та/або фонологічними проблемами або зі складнощами в розумінні зверненої мови.
- Діти віком 7–15 років
  - Усі вищенаведені проблеми, якщо ними не займались раніше
  - Особливо ті проблеми, які суттєво впливають на мову.

## Настанови

- [Настанова 00692](#). Розлади здатності до навчання.
- [Настанова 00694](#). Розлади аутистичного спектру.
- [Настанова 01051](#). Синдром дитячої незграбності.
- [Настанова 01023](#). Спостереження за психологічним розвитком дитини у дитячому закладі охорони здоров'я.
- [Настанова 00590](#). Структурні аномалії у дітей.

## Доказові огляди Duodecim

- [Доказовий огляд 02746](#). Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder.  
Дата оновлення: 2015-11-10  
Рівень доказовості: C  
Резюме: Speech and language therapy interventions may be effective for children with expressive phonological and vocabulary difficulties.

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

---

Ідентифікатор: ebm00582    Ключ сортування: 031.021    Тип: EBM Guidelines

---

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2018-08-09

---

Автор(и): Mari Qvarnström    Автор(и) попередніх версій статті: Ritva Kalenius    Редактор(и): Jukka Pekka Jousimaa  
Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd    Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

---

Навігаційні категорії

EBM Guidelines    Phoniatics    Paediatrics    Otorhinolaryngology    Neurology

---

Ключові слова індексу

mesh: Speech    Speech development    mesh: Child Development    mesh: Language Development  
mesh: delayed language and speech development    mesh: Speech Therapy    mesh: Infant    mesh: Dysarthria  
mesh: Articulation Disorders    mesh: Stuttering    icpc-2: A39    icpc-2: A97    speciality: Neurology  
speciality: Otorhinolaryngology    icpc-2: P24    icpc-2: P27    icpc-2: P39    speciality: Paediatrics    speciality: Phoniatics