

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00632&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00632. Вживання їдких речовин дітьми

Автор: Matti Nuutinen
Редактори оригінального тексту: -
Дата останнього оновлення: 2013-03-26

Основні положення

- Їдкі речовини включають кислоти (60–80% оцет, кислотні детергенти, кислота акумуляторів, затверджувач скловолкна) і луги з $\text{pH} \geq 12$ (їдкий луг, детергент посудомийних машин, аміак, гідроксид натрію).
- Особливо їдкими є луги з $\text{pH} > 12,5$ і кислоти з $\text{pH} < 2$.
- Належна перша допомога - полоскання рота і пиття рідини.
- Загалом діти без симптомів можуть перебувати під спостереженням вдома, але тих, хто має симптоми, слід скерувати до лікарні.

Перша допомога вдома

- Якомога швидше прополоскати рот і горло водою.
- Дати рідину (вода, молоко) для розведення корозійної речовини.
- Не викликати блювоту.

Перша допомога на первинній медичній допомозі

- Дітей без симптомів можна відправити додому для спостереження. Батькам рекомендується зв'язатися з лікарем при розвитку симптомів (див. нижче).

- Дисфагія (дитина не хоче їсти або пити), слинотеча, блювота або респіраторний дистрес є показами до негайного скерування у лікарню.
- Скеруйте в лікарню також всіх дітей, які проковтнули їдкий луг, невідому корозійну речовину, детергент посудомийних машин промислового використання (pH >12,5) чи сильну кислоту (pH < 2).
- Лабораторні тести, радіологічні обстеження, кортикостероїди [доказ|00588|B] [джерело|R1] чи антибіотики не показані.

Лікування в лікарні

- Якщо у дитини є дисфагія, слинотеча, блювота чи респіраторний дистрес, йому/їй показане спостереження у лікарні чи, за необхідності, у відділенні інтенсивної терапії.
- Гематемезис, утруднене дихання і одночасне виникнення більш ніж 3 симптомів свідчить про найсерйозніше корозійне ураження [джерело|R2].
- Дитина може вільно приймати рідину і їжу за відсутності блювоти і дисфагії, що заважають питтю і споживанню їжі (в іншому випадку слід призначити внутрішньовенні інфузії рідин).
- Рутинно не показані такі діагностичні обстеження, як езофагоскопія, лабораторні тести чи радіологічні обстеження. Езофагоскопія виконується не раніше, ніж через 24-36 годин у дітей, які мають саливацію і біль при ковтанні протягом 12-24 годин [доказ|00518|B].
- Через респіраторний дистрес може бути показана ендотрахеальна інтубація.

Пов'язані ресурси

- Література [пов'язані|00218|] [Ingestion of a caustic s...]

Джерела інформації

R1. Pelclová D, Navrátil T. Pelclová D, Navrátil T. Do corticosteroids prevent oesophageal stricture after corrosive ingestion? Toxicol Rev 2005;24(2):125-9 [PubMedID|16180932]

R2. Lamireau T, Rebouissoux L, Denis D et al. Accidental caustic ingestion in children: is endoscopy always mandatory? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;33(1):81-4. [PubMedID|11479413]

Доказові огляди Duodecim

- [Доказовий огляд 00588](#). Corticosteroids for children who have ingested a corrosive substance.
Дата оновлення: 2003-08-05
Рівень доказовості: B
Резюме: Corticosteroids appear not to prevent oesophageal injury caused by corrosive substances.
- [Доказовий огляд 00518](#). Assessment of oesophageal corrosion injury in children.
Дата оновлення: 2009-03-05
Рівень доказовості: B
Резюме: Oesophagoscopy appears to be indicated only in children with prolonged pain on swallowing or excessive salivation after ingestion of a corrosive substance.

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: [ebm00632](#) Ключ сортування: [029.026](#) Тип: [EBM Guidelines](#)

Дата оновлення англomовного оригіналу: [2013-03-26](#)

Автор(и): [Matti Nuutinen](#) Редактор(и): Видавець: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)
Власник авторських прав: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)

Навігаційні категорії
[EBM Guidelines](#) [Paediatrics](#) [Otorhinolaryngology](#)

Ключові слова індексу

speciality: [Paediatrics](#) speciality: [Otorhinolaryngology](#) mesh: [Caustics](#) [Caustic substance](#) mesh: [Child](#)
mesh: [Esophagus](#) mesh: [Intoxication](#) mesh: [Emergency Treatment](#) mesh: [Acids](#) mesh: [First Aid](#) mesh: [Lye](#)
mesh: [Alkalies](#) mesh: [Esophagoscopy](#) mesh: [Gastrointestinal Tract](#) icpc-2: [D80](#)