

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm01085&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 01085. Анкілоглоссія у дорослих

Автор: Tatu Kemppainen
Редактор оригінального тексту: Jukka Pekka Jousimaa
Дата останнього оновлення: 2016-08-28

Основні положення

- Анкілоглоссія (коротка вуздечка язика) зазвичай діагностується і лікується в дитинстві.
- Тим не менше, анкілоглоссія може зустрічатися у дорослих, і в цьому випадку коротку вуздечку язика можна надікати (френотомія) під місцевою анестезією.

Симптоми

- Коротка вуздечка язика може утруднювати підйом язика до передньої частини піднебіння, тим самим перешкоджаючи утворенню певних звуків (наприклад, Д, Т або С).
- Пацієнт з короткою вуздечкою язика може бути неспроможний висунути язика вперед з рота, тим самим утруднюючи лизання.
- В деяких випадках обмежена рухомість язика може впливати на гігієну рота.

Обстеження пацієнта

- Вуздечка язика є короткою, якщо
 - вуздечка є товста

- при висуванні верхівка язика стає “розрізаною” по середній лінії
- обмежена рухомість язика спостерігається з причин, наведених вище

Лікування

- Симптоматична коротка вуздечка язика може бути надсічена (френотомія) під місцевою анестезією.
- Після застосування місцевої анестезії вуздечка язика надсікається біля нижньої поверхні язика, не допускаючи пошкодження отворів проток підщелепної слинної залози, розташованих по обидва боки від вуздечки язика в передньо-нижній частині або будь-якої з розташованих під язиком вен.
- Процедура часто майже безкровна, а шви не обов’язкові.
- Рухомість язика повинна активно покращуватися після френотомії завдяки виконанню екстенсивних рухів язиком під час періоду загоєння слизової оболонки (близько 1 тижня).

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm01085 Ключ сортування: 038.012 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2016-08-28

Автор(и): Tatu Kempainen Редактор(и): Jukka Pekka Jousimaa Лінгвіст(и)-консультант(и) англomовної версії: Maarit Green
Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Otorhinolaryngology

Ключові слова індексу
speciality: Otorhinolaryngology ankyloglossia tongue tie tongue-tie tongue lingual frenulum lingual frenum
frenulum frenum frenotomy speech defect icpc-2: D81