

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:  
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm01096&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.  
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

# Настанова 01096. Мікоплазмова уrogenітальна інфекція

Автор: Eija Hiltunen-Back  
Редактор оригінального тексту: Heidi Alenius  
Дата останнього оновлення: 2017-05-26

## Основні положення

- Передається статевим шляхом
- Бактерія *Mycoplasma genitalium* відома давно, проте її значення як патогену було підтверджено в останні декілька років.
- Слід запідозрити мікоплазмову уrogenітальну інфекцію під час диференційної діагностики уретритів та цервіцитів з нечіткою симптоматикою після виключення хламідіозу [Настанова 00253 | Хламідійний уретрит і це...] та гонореї [Настанова 00254 | Гонорея].
- У північних країнах близько 5% стаціонарних пацієнтів поступають до лікувальних закладів з приводу захворювань, що передаються статевим шляхом.

## Етіологія і клінічна картина

- *Mycoplasma genitalium* це найменша відома бактерія.
- Клінічна картина нагадує хламідійну інфекцію.
- Поширеним є безсимптомний перебіг.
- Мікоплазма спричиняє уретрит у чоловіків, цервіцит у жінок, а також може спричинити запальні захворювання органів тазу [Настанова 00547 | Запальні захворювання жі...].

## Діагноз

- Виділення ДНК зі слизових оболонок або першої порції сечі.
- Забір зразків рекомендують проводити лише після негативних результатів досліджень на наявність хламідійної чи гонококової інфекції.
  - зокрема у чоловіків із уретритом невідомого генезу (виділення з уретри та пекучий біль при сечовипусканні)
  - у жінок із болем внизу живота, пекучим болем при сечовипусканні та посиленою лейкореєю
  - якщо у постійного статевого партнера діагностували інфекцію *Mycoplasma genitalium*.

## Лікування

- Лікування першого вибору - азитроміцин 500 мг в перший день і 250 мг щодня з другого по 5 день.
  - Кількість штамів, стійких до макролідів, постійно зростає.
  - Ефективність азитроміцину - 85–95%.
  - Якщо є підозра на резистентність штаму до азитроміцину, можна провести тест на визначення чутливості до антибіотиків.
- Якщо лікування азитроміцином не дає результатів: моксифлоксацин 400 мг 1 раз на добу протягом 7 днів
- Через 4 тижні після проведеного лікування рекомендується провести контрольний забір зразків, щоб підтвердити ефективність лікування.
- Одночасно обстежують та призначають лікування постійному статевому партнеру.
- Слід уникати незахищених статевих контактів, доки контрольні зразки на наявність інфекції не будуть негативними.

## Джерела інформації

R3. Taylor-Robinson D, Jensen JS. *Mycoplasma genitalium*: from Chrysalis to multicolored butterfly. Clin Microbiol Rev 2011;24(3):498-514. [PubMedID|21734246]

R4. Lis R, Rowhani-Rahbar A, Manhart LE. *Mycoplasma genitalium* infection and female reproductive tract disease: a meta-analysis. Clin Infect Dis 2015;61(3):418-26.

[PubMedID|25900174]

R5. Salado-Rasmussen K, Jensen JS. Mycoplasma genitalium testing pattern and macrolide resistance: a Danish nationwide retrospective survey. Clin Infect Dis 2014;59(1):24-30.

[PubMedID|24729494]

## Настанови

- [Настанова 00253](#). Хламідійний уретрит і цервіцит.
- [Настанова 00254](#). Гонорея.
- [Настанова 00547](#). Запальні захворювання жіночих статевих органів.

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

---

Ідентифікатор: ebm01096    Ключ сортування: 012.004    Тип: EBM Guidelines

---

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2017-05-26

---

Автор(и): Eija Hiltunen-Back    Редактор(и): Heidi Alenius  
Лінгвіст(и)-консультант(и) англomовної версії: Kristian LampeMaarit Green    Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd  
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

---

Навігаційні категорії  
EBM Guidelines    Infectious diseases    Gynaecology    Urology

---

Ключові слова індексу  
speciality: Gynaecology    speciality: Infectious diseases    Sexually Transmitted Diseases    Sexually Transmitted Disease  
Venereal disease    STD    Mycoplasma genitalium    Mycoplasma    Urethritis    Cervicitis    icpc-2: U99    icpc-2: A78  
icpc-2: X74    icpc-2: X85